

# Shunt Fostering

## Shunt fostering on a 3 week batch system

10

1

**Cel: dostarczenie dodatkowych możliwości na wykarmienie i utrzymanie przy życiu prosiąt poprzez funkcjonalne dojscie do sutków w miejscu karmienia.**

Sprzęt/informacja o wymaganiach	Bezpieczeństwo osobiste
<ul style="list-style-type: none"><li>Wzmacniacz dla prosiaków</li><li>Skrzynia/wózek dla przetaczania</li><li>Drzwi zewnętrzne do chlewa (dla zewnętrznych jednostek)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dla jednostek zewnętrznych pracują w parach, dla prośnych świń</li></ul>

### Przygotowanie

- Skrzynia/wózek będąca na linii winna być wyłożona sianem
- Ustalić liczbę karmionych prosiąt – nawet do 11 lub 12 sztuk
- Usunąć nadmierną liczbę prosiąt z linii
- Gdy całość osiągnie 9 lub 10 sztuk – zamknąć przetokę i rozpocząć proces

### Zarys działania

Należy zebrać wszystkie osłabione prosięta z każdego dnia przeglądu



Zidentyfikować najstarsze potomstwo, np. w 3 lub 4 dniu i przenieść je do skrzyni/wózka.



# Shunt Fostering

Zidentyfikować maciorę z 3-tygodniowym potomstwem, w dobrym stanie i bez uprzednich problemów zdrowotnych, oraz odebrać jej starsze prosięta.



Przenieść prosięta do części dla samców lub innego pomieszczenia, w którym będą mogły być przechowywane aż do momentu przeniesienia.



Zamknięte drzwi zapewniają pozostanie maciory wraz z prosiętami.



Dawka substancji raz na cztery dni powinna dostarczyć energii prosiętom oraz maciorze.

